

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować ARNIGEL[®] ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 5. dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

ARNIGEL[®] **żel**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

100 g żelu zawiera:

Substancje czynne:

Arnica montana TM 7 g

Substancje pomocnicze: karbomer, sodu wodorotlenek 10%, etanol 96 % v/v, woda oczyszczona.

Produkt zawiera 20% etanolu.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20 rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek ARNIGEL[®] i w jakim celu się go stosuje?
2. Zanim zastosuje się ARNIGEL[®].
3. Jak stosować lek ARNIGEL[®]?
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku ARNIGEL[®].
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku ARNIGEL[®].

1. Co to jest lek ARNIGEL[®] i w jakim celu się go stosuje?

ARNIGEL[®] jest żelem homeopatycznym stosowanym na skórę w takich schorzeniach jak: niewielkie urazy (siniaki, stłuczenia) oraz w bólach mięśni pojawiających się po intensywnym wysiłku fizycznym.

2. Zanim zastosuje się ARNIGEL[®].

Nie stosować u osób uczulonych na Arnica montana lub na jeden ze składników podłoża.

Nie stosować na błony śluzowe w obrębie twarzy, oczy, duże powierzchnie skóry oraz na rany.

Stosowanie leku ARNIGEL[®] u dzieci

Ze względu na zawartość etanolu nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku ARNIGEL[®] podczas ciąży i karmienia

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przy stosowaniu zgodnym z podanym poniżej sposobem dawkowania wpływ nieistotny.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Odradza się jednoczesnego stosowania ARNIGEL[®] i preparatów przeciwwzkrzepowych z grupy antagonistów witaminy K.

3. Jak stosować lek ARNIGEL®?

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku : nanieść cienką warstwę żelu na bolesne miejsce i wmasować delikatnie aż do całkowitego wchłonięcia.

Żel jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli i dzieci od 12. roku życia: stosować 1 – 3 razy dziennie.

W przypadku zastosowania większej ilości leku ARNIGEL® niż zalecana

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia dawki leku ARNIGEL®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, ARNIGEL® może powodować działania niepożądane.

U osób uczulonych na Arnikę mogą wystąpić miejscowe reakcje alergiczne: zaczerwienienie i swędzenie skóry, wypryski, pokrzywka.

W związku z zawartością alkoholu częste stosowanie leku może spowodować podrażnienia i miejscowe wysuszenie skóry.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku ARNIGEL®.

Brak specjalnych warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku ARNIGEL® po upływie terminu ważności wskazanym na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku ARNIGEL®.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

tel.: 022/702 66 70

Data opracowania ulotki: 02/2008