

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek OSTEOCYNESINE® ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

OSTEOCYNESINE® tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletkę zawiera:

Substancje czynne :

Calcarea carbonica ostreorum	3DH	0.075 g
Calcarea fluorica	3DH	0.075 g
Calcarea phosphorica	3DH	0.075 g
Sulfur iodatum	4CH	0.075 g

Substancje pomocnicze : sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

Zawartość opakowania : 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

Wytwórca

BOIRON SA

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Spis treści ulotki :

- 1.Co to jest lek OSTEOCYNESINE[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje?
- 2.Informacje ważne przed zażyciem leku OSTEOCYNESINE[®] tabletki.
- 3.Jak zażywać lek OSTEOCYNESINE[®] tabletki?
- 4.Możliwe działania niepożądane.
- 5.Jak przechowywać lek OSTEOCYNESINE[®] tabletki?
- 6.Inne informacje.

1.Co to jest lek OSTEOCYNESINE[®] tabletki i w jakim celu się go stosuje?

OSTEOCYNESINE[®] tabletki jest lekiem stosowanym wspomagająco w stanach niedoboru wapnia.

2.Informacje ważne przed zażyciem leku OSTEOCYNESINE[®] tabletki.

Kiedy nie zażywać leku OSTEOCYNESINE[®] tabletki

Leku OSTEOCYNESINE[®] nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek OSTEOCYNESINE[®] tabletki

O zastosowaniu i dawkowaniu leku u dzieci poniżej 6 roku życia decyduje lekarz.

Zażywanie leku OSTEOCYNESINE® tabletki z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku OSTEOCYNESINE® z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku OSTEOCYNESINE® tabletki

Lek OSTEOCYNESINE® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak zażywać lek OSTEOCYNESINE® tabletki?

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku OSTEOCYNESINE® to:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: ssać powoli lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody po 2 tabletki dwa lub trzy razy dziennie.

Dzieci poniżej 6 roku życia: wg wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku OSTEOCYNESINE®

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku OSTEOCYNESINE®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku OSTEOCYNESINE® tabletki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, OSTEOCYNESINE® tabletki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek OSTEOCYNESINE® tabletki?

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku OSTEOCYNESINE® po upływie terminu ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Boiron Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Tel.: 022/702 66 70

Fax: 022/702 66 71

e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 10/2009